

| レジメン名 | wHER+GEM | | | | |
|-----------|----------|------|--|---------|-----|
| 対象がん種 | 乳がん | 対象患者 | | 催吐リスク | 軽度 |
| | | | | 1コースの日数 | 21日 |
| | | | | 投与予定回数 | なし |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 | なし |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | |
|------------------------|-------|--------------|
| 項目 | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | 好中球減少 | 95.2% |
| | 貧血 | 71.0% |
| | | 0.0% |
| その他 | ALT上昇 | 77.4% |
| | 発熱 | 32.2% |
| | 間質性肺炎 | 1.4% |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|--------------|----------------------------------|------|----------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 生食 | 50 ml | 点滴静注 | 100 ml/h | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | 休薬完了 |
| 2 | ハーセプチン 生食 | 2 mg/kg 250 ml | 点滴静注 | 1時間 | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | |
| 3 | ゲムシタピン 生食 | 1250 mg/m ² 100 ml | 点滴静注 | 200 ml/h | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50 ml

100 ml/h

②

点滴静注

ハーセプチン 2 mg/kg
生食 250 ml

1時間

③

点滴静注

ゲムシタピン 1250 mg/m²
生食 100 ml

200 ml/h

軽度炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要