

レジメン名	HT				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	確吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	28日
			再発	投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有る場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	発熱性好中球減少	2.0%
	好中球減少	6.0%
	貧血	2.0%
その他	神経障害	29.0%
	下痢	4.0%
	筋肉痛	3.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	100 ml/h			●							●							●															
2	ハーセプチン 生食	2 mg/kg 250 ml	点滴静注	1時間			●							●							●															
3	デキサート ガスター ボラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h			●							●							●															
4	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●							●															
5	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml	点滴静注	1時間			●							●							●															

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	なし																																			

day 1, 8, 15

滴下順

主観

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

ハーセプチン  
生食

2 mg/kg 250 ml
-------------------

1時間

③

デキサート  
ガスター  
ボラミン  
生食

6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
----------------------------------

300 ml/h

④

生食

50 ml
-------

100 ml/h

⑤

パクリタキセル  
5%ブドウ糖液

80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
--------------------------------

1時間

軽度炎症性  
フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

超壊死性  
フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要

day 22

滴下順

主観

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

ハーセプチン  
生食

2 mg/kg 250 ml
-------------------

1時間

軽度炎症性  
フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要