

レジメン名	TC3週毎				
対象がん種	乳がん	対象患者	術後化学療法	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名			投与予定回数	なし	
			投与回数上限	なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	62.0%
		0.0%
		0.0%
その他	関節痛	78.0%
	筋肉痛	33.0%
	悪心	53.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																				休薬完了
2	デキサート ボラミン 生食	9.9 mg 5 mg 100 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				
3	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
4	エンドキサン 生食	600 mg/m ² 100 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

デキサート ボラミン 生食	9.9 mg 5 mg 100 ml
---------------------	--------------------------

200 ml/h

③

ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml
-------------------	--------------------------------

1時間

④

エンドキサン 生食	600 mg/m ² 100 ml
--------------	---------------------------------

200 ml/h

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要