

レジメン名	wトラスツマブ 2回目投与以降				
対象がん種	乳がん	対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	7日
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	なし
				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	悪寒	18.0%
	頭痛	10.0%
	悪心	10.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	1	2	3	4	5	6	7
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	100 ml/h		•						
2	トラスツマブB S注射用水 生食	2 mg/kg 0.095 ml/kg 250 ml	点滴静注	1時間		•						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし										

滴下順

主管
投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間
投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

トラスツマブB	2 mg/kg
S注射用水	0.095 ml/kg
生食	250 ml

1時間

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要