

レジメン名	EC療法（術前・術後）				
対象がん種	乳がん	対象患者	初発	催吐リスク	高度
			術前化学療法	1コースの日数	21日
			術後化学療法	投与予定回数	4-6コース
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目		対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	
	貧血	
その他	悪心	
	嘔吐	
	脱毛	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																				
2	ガスター デキサート アロキシ 生食	20mg 9.9mg 0.75mg 100mL	点滴静注	200mL/hr			●																				
3	エビルピシン 生食	90mg/m2 100mL	点滴静注	500mL/hr			●																				
4	生食	100mL	点滴静注	500mL/hr			●																				
5	エンドキサン 生食	600mg/m2 250mL	点滴静注	250mL/hr			●																				
6	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	イメンドカプセル	125mg/回	化学療法前		●																					
2	イメンドカプセル	80mg/回	朝食後			●	●																			
3	デカドロン錠	4mg/回	朝・昼食後			●●	●●	●●																		

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備者

①
点滴静注

生食	50mL
	100mL/hr

②
点滴静注

ガスター デキサート アロキシ 生食	20mg 9.9mg 0.75mg 100mL
	200mL/hr

③
点滴静注

エビルピシン 生食	90mg/m2 100mL
	500mL/hr

④
点滴静注

生食	100mL
	500mL/hr

⑤
点滴静注

エンドキサン 生食	600mg/m2 250mL
	250mL/hr

⑥
点滴静注

生食	50mL
	100mL/hr

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要