

レジメン名	アテゾリズマブ+nab-PTX療法				
対象がん種	乳がん	対象患者	切除不能進行・再発	嘔吐リスク	軽度
内服抗がん剤の有無				1コースの日数	28日
※有の場合薬剤名				投与予定回数	なし
				投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	24.8%
	好中球減少	20.6%
		0.0%
その他	間質性肺炎	3.1%
	下痢	32.5%
	皮膚障害	46.2%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																												
2	テセントリク 生食	840 mg 250 ml	点滴静注	初回60分、2回目以降30分まで短縮可能			●																												
3	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																												
4	デキサート 生食	6.6 mg 50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●																					
5	アブラキサン 生食	100 mg/m ² 20 ml/m ²	点滴静注	30分			●							●																					
6	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	なし																																		

滴下順
主観
投与方法

①

②

③

④

⑤

⑥

薬剤・用量

生食	50 ml
----	-------

テセントリク 生食	840 mg 250 ml
--------------	------------------

生食	50 ml
----	-------

デキサート 生食	6.6 mg 50 ml
-------------	-----------------

アブラキサン 生食	100 mg/m ² 20 ml/m ²
--------------	---

生食	50 ml
----	-------

投与速度/時間
投与時刻(必要時)

100 ml/h

100 ml/h

100 ml/h

30分

100 ml/h

漏出時リスク

軽度炎症性
フィルター必要

遮光

バッグ、ルートともに遮光不要
初回60分、2回目以降30分まで
短縮可能

備考

起壊死性
フィルター不可

バッグ、ルートともに遮光不要