

レジメン名	DOC+HER2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	軽度
			術後化学療法 再発	1コースの日数 投与予定回数	21日 4コース
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50 ml	点滴静注	100 ml/h				●																				
2	ハーセプチン 生理食塩液	6 mg/kg 250 ml	点滴静注	1時間				●																				
3	ボラミン デキササート 生理食塩液	5 mg 6.6 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h				●																				
4	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間				●																				
5	生理食塩液	50 ml		100 ml/h				●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカドロン錠	8 mg/日	1日2回		●●		●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

②

点滴静注

ハーセプチン 生理食塩液	6 mg/kg 250 ml
	1時間

③

点滴静注

ボラミン デキササート 生理食塩液	5 mg 6.6 mg 50 ml
	300 ml/h

④

点滴静注

ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml
	1時間

⑤

点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要