

レジメン名	エンハーツ				
	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	中等度
対象がん種				1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	貧血	21.7%	G1になるまで休薬
		0.0%	
		0.0%	
その他	悪心	76.1%	G3では休薬
	下痢	21.7%	G1になるまで休薬
	脱毛	46.2%	規定なし

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h			●																				休薬完
2	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注	100ml/h			●																				
3	5%ブドウ糖	50ml	点滴静注	200ml/h			●																				
4	エンハーツ 注射用水 5%ブドウ糖	5.4mg/kg 0.27ml/kg 100ml	点滴静注	初回90分 2回目以降30分			●																				
5	5%ブドウ糖	50ml	点滴静注	200ml/h			●																				

内服抗がん剤・制吐剤

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	グラニセトロンゼリー	2mg	投与前内服		●																					

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50ml
----	------

100ml/h

②  
点滴静注

デキサート 生食	6.6mg 50ml
-------------	---------------

100ml/h

③  
点滴静注

5%ブドウ糖	50ml
--------	------

200ml/h

④  
点滴静注

エンハーツ 注射用水 5%ブドウ糖	5.4mg/kg 0.27ml/kg 100ml
-------------------------	--------------------------------

備考欄参照

⑤  
点滴静注

5%ブドウ糖	50ml
--------	------

200ml/h

炎症性  
フィルター必要  
バッグは遮光、ルートは遮光不要  
初回90分、2回目以降  
30分まで短縮可能