

レジメン名	エリブリン+3wHER			
対象がん種	乳がん	対象患者	催吐リスク	軽度
			1コースの日数	21日
			投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 生食	ハーセブチン	50 ml	点滴静注	100 ml/h	●								●														休薬完了
2 ハーセブチン 生食		6 mg/kg 250 ml	点滴静注	250 ml/h	●																						
3 デキサート 生食		6.6 mg 50 ml	点滴静注	100 ml/h	●								●														
4 ハラヴェン 生食		1.4 mg/m <sup>2</sup> 50 ml	点滴静注	500 ml/h	●								●														
5 生食		50 ml	点滴静注	100 ml/h	●								●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 なし																									

day 1 滴下順

主管	①	②	③	④	⑤
投与方法					
薬剤・用量	生食 50 ml	ハーセブチン 6 mg/kg 生食 250 ml	デキサート 6.6 mg 生食 50 ml	ハラヴェン 1.4 mg/m <sup>2</sup> 生食 50 ml	生食 50 ml
投与速度/時間	100 ml/h	1時間	100 ml/h	500 ml/h	100 ml/h
投与時刻(必要時)					

漏出時リスク  
フィルター  
遮光  
備考

軽度炎症性  
フィルター不要  
ソグ、ルートともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
ソグ、ルートともに遮光不要

day 8 滴下順

主管	①	②	③	④
投与方法				
薬剤・用量	生食 50 ml	デキサート 6.6 mg 生食 50 ml	ハラヴェン 1.4 mg/m <sup>2</sup> 生食 50 ml	生食 50 ml
投与速度/時間	100 ml/h	100 ml/h	500 ml/h	100 ml/h
投与時刻(必要時)				

炎症性  
フィルター不要  
ソグ、ルートともに遮光不要