

レジメン名	PER+HER+ハラヴェン初回				
対象がん種	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし			投与予定回数	1回
				投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50 ml	点滴静注	100 ml/h				●							●													休薬完了
2	バージェタ 生理食塩液	840 mg 250 ml	点滴静注	1時間				●																				
3	ハーセプチン 生理食塩液	8 mg/kg 250 ml	点滴静注	90分				●																				
4	生理食塩液	100 ml	点滴静注	100 ml/h				●							●													
5	デキサート 生理食塩液	6.6 mg 50 ml	点滴静注	100 ml/h				●							●													
6	ハラヴェン 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 ml	点滴静注	500 ml/h				●							●													
7	生理食塩液	50 ml		100 ml/h				●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																										

day 1

滴下順

主薬

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注	
生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

②

点滴静注	
バージェタ 生理食塩液	840 mg 50 ml
	1時間

③

点滴静注	
ハーセプチン 生理食塩液	8 mg/kg 250 ml
	90分

④

点滴静注	
生理食塩液	100 ml
	100 ml/h

⑤

点滴静注	
デキサート 生理食塩液	6.6 mg 50 ml
	100 ml/h

⑥

点滴静注	
ハラヴェン 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 ml
	500 ml/h

⑦

点滴静注	
生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

day 8

滴下順

主薬

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注	
生理食塩液	100 ml
	100 ml/h

②

点滴静注	
デキサート 生理食塩液	6.6 mg 50 ml
	100 ml/h

③

点滴静注	
ハラヴェン 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 ml
	500 ml/h

④

点滴静注	
生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要