

レジメン名	PER+トラスツズ マブ +wPTX初回				
対象がん種	乳がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの回数	21日
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	1回
※有の場合薬剤名				投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●							●						休業完了
2	パージェタ 生食	840 mg 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
3	トラスツズマブBS 注射用水 生食	8 mg/kg 0.38 ml/kg 250 ml	点滴静注	90分			●																				
4	生食	100 ml	点滴静注	100 ml/h			●																				
5	デキサート ガスター ポラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h			●							●							●						
6	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●							●						
7	バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml	点滴静注	1時間			●							●							●						
8	生食	50 ml	点滴静注	200 ml/h			●							●							●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

day1

滴下順

主警告

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50 ml
100 ml/h	

②  
点滴静注

パージェタ 生食	840 mg 250 ml
1時間	

③  
点滴静注

トラスツズマブBS 注射用水 生食	8 mg/kg 0.38 ml/kg 250 ml
90分	

④  
点滴静注

生食	100 ml
100 ml/h	

⑤  
点滴静注

デキサート ガスター ポラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
300 ml/h	

⑥  
点滴静注

生食	50 ml
100 ml/h	

⑦  
点滴静注

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
1時間	

⑧  
点滴静注

生食	50 ml
200 ml/h	

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

起壊死性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要

day8, 15

主警告

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50 ml
100 ml/h	

②  
点滴静注

デキサート ガスター ポラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
300 ml/h	

③  
点滴静注

生食	50 ml
100 ml/h	

④  
点滴静注

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
1時間	

⑤  
点滴静注

生食	50 ml
200 ml/h	

起壊死性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要