

レジメン名	TCトラスツマブ（2回目以降）				
対象がん種	乳がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																				休薬完了
3	トラスツマブBS 注射用水 生食	2 mg/kg 0.095ml/kg 250 ml	点滴静注	1時間			●							●							●						
3	デキサート 生食	6.6 mg 100 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				
4	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
5	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC:6 250 ml	点滴静注	1時間			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	グラニセトロン	2 mg	化学療法前		●																					
2	デカドロン錠	4 mg	朝・夕食後			●●	●●																			

day 1 滴下順

主管
投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間
投与時刻(必要時)
漏出時リスク
フィルター
遮光
備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

トラスツマブBS 注射用水 生食	2 mg/kg 0.095ml/kg 250 ml
------------------------	---------------------------------

1時間

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

③

デキサート 生食	6.6 mg 100 ml
-------------	------------------

200 ml/h

④

ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml
-------------------	--------------------------------

1時間

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

⑤

カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC:6 250 ml
--------------------	-----------------

1時間

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

day 8, 15

主管
投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間
投与時刻(必要時)
漏出時リスク
フィルター
遮光
備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

トラスツマブBS 注射用水 生食	2 mg/kg 0.095ml/kg 250 ml
------------------------	---------------------------------

1時間

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要