

レジメン名	VNB2投1休				
対象がん種	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無				投与予定回数	なし
				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	74%(Grade \geq 3)
	貧血	10%(Grade \geq 3)
	血小板減少	2%(Grade \geq 3)
その他	静脈炎	60.0%
	嘔吐	13.0%
	疲労	20.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●														休薬完了
2	ロゼウス 生食	25 mg/m ² 50 ml	点滴静注	500 ml/h			●							●														
3	生食	250 ml	点滴静注	500 ml/h			●							●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	なし																										

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
	100 ml/h

②

ロゼウス 生食	25 mg/m ² 50 ml
	500 ml/h

③

生食	250 ml
	500 ml/h

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要