

ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		医師名
					測定日	測定日	測定日	測定日			
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSEX	@PATIENTBIRTH	NTAGEFOR	HEIGHT01_D	cm	HEIGHT01_I	kg	#VALUE!	m ²	@USERNAME
					\$HEIGHT02_Doc		\$WHEIGHT02_Doc		1900/1/0		

レジメン名	PER+HER+ハラヴェン2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	1回
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rp 薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																			休薬完了
1 生理食塩液	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																	
2 パージェタ 生理食塩液	420 mg 250 ml	点滴静注	500 ml/h			●																	
3 ハーセプテン 生理食塩液	6 mg/kg 250 ml	点滴静注	1時間			●																	
4 デキサート 生理食塩液	6.6 mg 50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																	
5 ハラヴェン 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 ml	点滴静注	500 ml/h			●																	
6 生理食塩液	50 ml		100 ml/h			●																	

内服抗がん剤・支持療法薬

day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Rp 薬剤名	投与量	用法																					
1 なし																							

day 1

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

②

点滴静注

パージェタ 生理食塩液	420 mg 250 ml
	500 ml/h

③

点滴静注

ハーセプテン 生理食塩液	6 mg/kg 250 ml
	1時間

④

点滴静注

デキサート 生理食塩液	6.6 mg 50 ml
	100 ml/h

⑤

点滴静注

ハラヴェン 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 ml
	500 ml/h

⑥

点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

day 8

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

②

点滴静注

デキサート 生理食塩液	6.6 mg 50 ml
	100 ml/h

③

点滴静注

ハラヴェン 生理食塩液	1.4 mg/m ² 50 ml
	500 ml/h

④

点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要