

レジメン名	PER+HER+wPTX2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし		再発	投与予定回数	4コース
				投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●														
2	バージェタ 生食	420 mg 250 ml	点滴静注	500 ml/h			●																					
3	ハーセプチン 生食	6 mg/kg 250 ml	点滴静注	1時間			●																					
4	デキサート ガスター ポラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h			●							●														
5	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●														
6	バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml	点滴静注	1時間			●							●														
7	生食	50 ml	点滴静注	200 ml/h			●							●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

day1

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②  
点滴静注

バージェタ 生食	420 mg 250 ml
-------------	------------------

500 ml/h

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

③  
点滴静注

ハーセプチン 生食	6 mg/kg 250 ml
--------------	-------------------

1時間

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

④  
点滴静注

デキサート ガスター ポラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
-----------------------------	----------------------------------

300 ml/h

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

⑤  
点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

⑥  
点滴静注

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
--------------------	--------------------------------

1時間

起壊死性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要

⑦  
点滴静注

生食	50 ml
----	-------

200 ml/h

day8, 15

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②  
点滴静注

デキサート ガスター ポラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
-----------------------------	----------------------------------

300 ml/h

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

③  
点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

軽度炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

④  
点滴静注

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
--------------------	--------------------------------

1時間

起壊死性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要

⑤  
点滴静注

生食	50 ml
----	-------

200 ml/h