レジメン名	mCAPIRI+Bmab				
対象がん種	大腸がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考（投与時刻、モニターなど）																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
2	デキサート パロノセトロン プリンペラン 生食	9.9mg 0.75mg 10mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
3	ベバシズマブ 生食	7.5mg/kg 100ml	点滴静注	初回90分、 2回目60分 3回目以降30分		●																				
4	イリノテカン 5%ブドウ糖液	200mg/m2 250ml	点滴静注	2時間		●																				
5	生食	100ml	点滴静注	100ml/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カペシタビン	800mg/m^2/回				●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●							