レジメン名	DLd療法　3～6コース目（D皮下注）				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	軽度
	性ALアミロイドーシス		初発	1コースの日数	28
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞ,ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	12.3%	休薬することがある
	血小板減少	9.2%	同上
	貧血	8.1%	同上
その他	infusion reaction	12.7%	中断、ステロイド投与など
	肺炎	3.8%	休薬することがある

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	ダラキューロ	15mL	皮下注	3-5分		●														●													

内服抗がん剤・支持療法薬

初発

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール	900mg	ダラキューロ1時間前			●														●													
2	レナデックス	40mg	1日1回（ダラキューロ1時間前）			●							●							●							●						
3	ポララミンシロップ	2mg	ダラキューロ1時間前			●														●													
4	レブラミド	25mg	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
5	他、適宜アシクロビル、ST合剤など																																

再発・難治

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール	900mg	ダラキューロ1時間前			●														●													
2	レナデックス	20mg	1日1回（ダラキューロ1時間前）			●	●						●	●						●	●						●	●						
3	アタラックスPカプセル	25mg	ダラキューロ1時間前			●														●													
4	レブラミド	25mg	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
5	他、適宜アシクロビル、ST合剤など																																