| レジメン名 | GC | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 卵巣がん | 対象患者 | | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 | 21 |
| | | | | 投与予定回数 | |
| 内服抗がん剤の有無 | | | | 投与回数上限 | |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
|---|---|---|---|
| 血液毒性 | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他 | | | |
| | | | |
| | | | |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デキサート<br>生食 | 6.6mg<br>100mL | 点滴静注 | 200mL/h | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ゲムシタビン<br>生食 | 1000mg/㎡<br>100mL | 点滴静注 | 200mL/h | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | カルボプラチン<br>5%ブドウ糖 | AUC：4<br>250mL | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラニセトロン | 2mg/day | 投与前内服 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |