レジメン名	MEA療法				
対象がん種	子宮体がん	対象患者		催吐リスク	中等度
	絨毛がん			1コースの日数	14日間
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	ソルデム3A（主） 重曹7%	500ml 20ml	点滴静注	6時間	0:00	●													
2	ソルデム3A（主） 重曹7%	500ml 20ml	点滴静注	6時間	6:00	●													
3	ソルデム3A（主） 重曹7%	500ml 20ml	点滴静注	6時間	12:00	●													
4	ソルデム3A（主） 重曹7%	500ml 20ml	点滴静注	6時間	18:00	●													
5	生食（側） デキサート プロイメンド	100ml 4.95mg 150mg	点滴静注	30分	9:30	●													
6	生食（側）	50ml	点滴静注	30分	10:00	●													
7	生食（側） エトポシド	500ml 100mg/body	点滴静注	2時間	10:30	●													
8	生食（側） コスメゲン 注射用水	50ml 0.5mg/body 1ml	点滴静注	15分	12:30	●													
9	生食（側） メトトレキサート	50ml 150mg/body	点滴静注	15分	12:45	●													
10	生食（側） メトトレキサート	500ml 300mg/body	点滴静注	4時間	13:00	●													
11	ラクテック（主）	500ml	点滴静注	6時間	0:00		●	●	●										
12	ラクテック（主）	500ml	点滴静注	6時間	6:00		●	●	●										
13	ソルデム3A（主）	500ml	点滴静注	6時間	12:00		●	●	●										
14	ソルデム3A（主）	500ml	点滴静注	6時間	18:00		●	●	●										
15	生食（側） ダイアモックス	100ml 500mg	点滴静注	30分	9:00		●												
16	生食（側）	50ml	点滴静注	フラッシュ用			●												
17	生食（側） デキサート	100ml 1ml	点滴静注	30分	9:30		●	●	●										
18	生食（側） エトポシド	500ml 100mg/body	点滴静注	2時間	10:00		●	●	●										
19	生食（側） ロイコボリン	50ml 15mg	点滴静注	15分	10:15		●	●											
20	生食（側） コスメゲン 注射用水	50ml 0.5mg/body 1ml	点滴静注	15分	12:15		●	●	●										
21	生食（側） ロイコボリン	50ml 15mg	点滴静注	15分	22:15		●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	グラニセトロン	2mg	1日1回化学療法前			●	●	●	●										