| レジメン名 | IC PCE (初回) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対象がん種 | 頭頸部がん | 対象患者 | 切除不能進行 | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 | 7 |
| | | | | 投与予定回数 | 1 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 | 1 |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

| 項目 | | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
|---|---|---|---|
| 血液毒性 | 好中球減少 | 80.0% | G4では次回1段階減量、G2以下になるまで延期 |
| | | | |
| | | | |
| その他 | 発疹 | 91.4% | 保湿薬、ステロイド薬、事前の皮膚科コンサルト |
| | | | |
| | | | |

レジメン内容（支持療法を含む）

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | 休薬完了 |
| 1 | 生理食塩水 | 50ml | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | |
| 2 | デキサート<br>ポララミン<br>ファモチジン<br>生理食塩水 | 6.6mg<br>5mg<br>20mg<br>100ml | 点滴静注 | 15分 | | ● | | | | | | |
| 3 | パクリタキセル<br>5%ブドウ糖液 | 80mg/m2<br>250ml | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | |
| 4 | カルボプラチン<br>5%ブドウ糖液 | AUC1.5<br>250ml | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | |
| 5 | 生理食塩水 | 50ml | 点滴静注 | 600ml/h | | ● | | | | | | |
| 6 | アービタックス<br>生理食塩水 | 400mg/m2<br>500ml | 点滴静注 | 2時間 | | ● | | | | | | |
| 7 | 生理食塩水 | 100ml | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | | | | | | | | | | | |