レジメン名		5FU+MMC+RT												
対象がん種	肛門管癌	対象患者	初発	催吐リスク	軽度									
				1コースの日数	28									
				投与予定回数	2									
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	2									
※有の場合薬剤名		1												

副作用情報(頻	頁度が高い、特徴的な副作	作用など)	
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少		
	血小板減少		
その他	肛門痛,皮膚炎		(放射線に伴う) 外用剤等適宜使用
	悪心		

## レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	. 5	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)																											1	休薬
1	生食	100 mL	点滴静注	100 mL/h		•																											
2	生食 デキサート 生食 *側管から	6.6 mg 100 mL	点滴静注	204 mL/h		•																											
3	マイトマイシン 注射用水 *側管から ボトルに調製	10 mg/m^2 25 mL/m^2	点滴静注	500 mL/h		•																											
4	フルオロウラシル 生食	1000 mg/m^2 500 mL	点滴静注	24 mL/h		•	•	•																									
5	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h				•																									_