レジメン名	患者限定nab-PTX(アブラキサン療法)				
対象がん種	悪性黒色腫	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考（投与時刻、モニターなど）																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●							●							●													
2	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●													
3	アブラキサン 生食	100mg/m^2 20ml/m^2	点滴静注	30分		●							●							●													
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●							●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																