レジメン名	Necitumumab+CDDP+GEM				
対象がん種	肺がん	対象患者	初発	催吐リスク	高度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	21日
				投与予定回数	4コース
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	6コース
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	42.0%	延期、減量、G-CSF投与
	貧血	35.1%	延期、減量、輸血
	血小板減少	19.3%	延期、減量、輸血
その他	悪心	48.3%	制吐剤使用
	嘔吐	26.8%	制吐剤使用
	下痢	10.6%	止痢薬使用

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	200mL/hr		●							●													
2	生理食塩水 ボートラーザ注	250ml 800mg	点滴静注	1時間		●							●													
3	生理食塩水	50ml	点滴静注	200mL/hr		●							●													
4	生理食塩水 プロイメンド点滴静注用	100mL 150mg	点滴静注	200mL/hr		●																				
5	生理食塩水 デキサート注 パロノセトロン注	50ml 9.9mg 0.75mg	点滴静注	100mL/hr		●																				
6	生理食塩水 デキサート注	50ml 3.3mg	点滴静注	100mL/hr									●													
7	生理食塩水 ゲムシタビン注	100ml 1250mg/m2	点滴静注	200mL/hr		●							●													
8	ソリューゲンG アスパラカリウム 硫酸マグネシウム	500ml 10mEq 8mEq	点滴静注	500mL/hr		●																				
9	マンニットール注	300mL	点滴静注	500mL/hr		●																				
10	生理食塩水 シスプラチン注	250ml 75mg/m2	点滴静注	1時間30分		●																				
11	ソリューゲンG アスパラカリウム	500ml 10mEq	点滴静注	500mL/hr		●																				
13	生理食塩水	50mL	点滴静注	200mL/hr									●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠4mg	2錠/day	朝・昼食後				●	●	●																	