レジメン名	FP+Radiation(60Gy)(Stagel)				
対象がん種	食道がん	対象患者	初発	催吐リスク	高度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	28日間
				投与予定回数	−
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	−
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)(Grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	26.0%	FP、CDDPの減量・中止・延期、G
	好中球数減少	19.0%	FP、CDDPの減量・中止・延期、G
	食道炎	23.0%	FPの減量・中止・延期
その他	低Na血症	17.0%	輸液、Na補給

RT　60Gy/30fr/6w

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	200ml/hr	主管A	●																											
2	生食	100 ml	点滴静注	30分間	側A-1	●																											
3	デキサート プロイメンド 生食	9.9mg 150mg 100mL	点滴静注	30分間	側A-1	●																											
4	パロノセトロン 生食	0.75 mg 100 mL	点滴静注	30分間	側A−1	●																											
5	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
6	硫酸Mg補正液 生食	20 mL 100mL	点滴静注	30分間	側A-1	●																											
7	シスプラチン 生食	70 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	2時間	側A-1	●																											
8	デキサート 生食	6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分間	側A-1		●	●	●																								
9	フルオロウラシル 5%ブドウ糖	700 mg/㎡ 500 mL	持続静注	24時間	側A-1	●	●	●	●																								
10	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
11	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
12	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
13	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	100ml/hr	主管A	●																											
14	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●																								
15	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●																								
16	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●																								
17	ソリューゲンF輸液	500 mL	点滴静注	80ml/hr	主管A		●	●	●																								

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	なし																																