レジメン名	Flu+ Mel140				
対象がん種	急性骨髄性白血病	対象患者	再発・難治	催吐リスク	高度
	急性リンパ性白血病			1コースの日数	7 days
	悪性リンパ腫			投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制		抗菌薬、G-CSF製剤、輸血
その他	肝障害	25.0%	UDCA内服
	肺障害	25.0%	術前のスクリーニング
	腎障害	50.0%	術前のスクリーニング

レジメン内容（支持療法を含む）

												移植
					day	1 (-6)	2 (-5)	3 (-4)	4 (-3)	5 (-2)	6 (-1)	7 (0)
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●	●		
2	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr					●			
3	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	110mL/hr					●			
4	フルダラ 生理食塩液	25mg/m^2 100mL	点滴静注	200mL/hr		●	●	●	●	●		
5	アルケラン	70mg/m^2	点滴静注	20min					●	●		
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●	●	●		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	前頁の備考参照											