

レジメン名	CDDP+GEM+S1				
対象がん種	胆道がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	14日間
内服抗がん剤の有無				投与予定回数	PDまで
※有の場合薬剤名				投与回数上限	PDまで

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	貧血	32.0%	
	好中球減少	19.0%	延期、減量、G-CSF投与
	血小板減少	28.0%	延期
その他	悪心/食欲不振	38.0%	制吐剤投与
	疲労	31.0%	
	下痢	6.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
																					休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	30分			●														
2	生理食塩水	500ml	点滴静注	2時間			●														
3	生理食塩水 デキサート ブイメンド	100ml 9.9mg 150mg	点滴静注	30分			●														
4	生理食塩水	20ml	静注				●														
5	生理食塩水 パロノセトロン	100ml 0.75mg	点滴静注	30分			●														
6	生理食塩水 シスプラチン	total 150ml 25mg/m2	点滴静注	2時間			●														
7	生理食塩水 ゲムシタピン	100ml 1000mg/m2	点滴静注	30分			●														
8	生理食塩水	500ml	点滴静注	2時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	S1	80 mg/m2	1日2回		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●							