レジメン名	名 MEAM								
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	高度				
1				1コースの日数	6 days				
				投与予定回数	1				
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1				
※有の場合薬剤名									

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)									
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)						
血液毒性	骨髄抑制		抗菌薬、G-CSF製剤、輸血						
その他	嘔気		制吐剤、補液						
	下痢		止痢剤など						
	粘膜炎		クライオセラピー						

レジメン内容(支持療法を含む)

	メン内谷(文持療法を言う				day	1(-7)	2(-6)	3(-5)	4(-4)	5(-3)	6(-2)	7(-1)	0
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)			1 ` ′			1 ` ′		休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		•	•	•	•	•	•		
2	サイメリン 生理食塩液	300mg/m ² 100mL	点滴静注	100mL/hr		•							
3	エトポシド 5%ブドウ糖	100mg/m ² 250mL	点滴静注	250mL/hr			•	•	•	•			
4	シタラビン 生理食塩液	200mg/m ² 100mL	点滴静注	100mL/hr			•	•	•	•			
5	エトポシド 5%ブドウ糖	100mg/m ² 250mL	点滴静注	250mL/hr			•	•	•	•			
6	シタラビン 生理食塩液	200mg/m ² 100mL	点滴静注	100mL/hr			•	•	•	•			
7	プロイメンド 生理食塩液	150mg 100mL	点滴静注	200mL/hr							•		
8	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr							•		
9	パロノセトロン 生理食塩液	0.75mg 50mL	点滴静注	110mL/hr							•		
10	アルケラン	140mg/m ²	点滴静注	20min							•		
11	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		•	•	•	•	•	•		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	 day	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 カイトリル					•	•	•	•			
	2 前頁の備考参照											