レジメン名	STZ+5-FU					
対象がん種	神経内分泌新生物	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	高度
				1コースの日数	42日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	血球減少	57.4%	減量・休薬、G-CSF投与
その他	悪心・嘔吐	80.0%	適切な制吐剤投与
	下痢	40.0%	止痢剤投与
	皮疹・粘膜障害	36.5%	ステロイド剤外用、保湿など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												
1	生理食塩水	500ml	点滴静注	2時間		●	●	●	●	●																							
2	生理食塩水 プロイメンド デキサート	100ml 150mg 9.9mg	点滴静注	30分		●																											
3	生理食塩水 パロノセトロン	100ml 0.75mg	点滴静注	30分		●																											
4	生理食塩水 デキサート	100ml 6.6mg	点滴静注	30分			●	●	●	●																							
5	生理食塩水 ザノサー	100ml 500mg/m2	点滴静注	30分		●	●	●	●	●																							
6	生理食塩水 フルオロウラシル	100ml 400mg/m2	点滴静注	30分		●	●	●	●	●																							
7	生理食塩水	250ml	点滴静注	1時間		●	●	●	●	●																							
8	ヘパリンNaロック用 10単位	10ml	静注			●	●	●	●																								

					day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生理食塩水	500ml	点滴静注	2時間															
2	生理食塩水 プロイメンド デキサート	100ml 150mg 9.9mg	点滴静注	30分															
3	生理食塩水 パロノセトロン	100ml 0.75mg	点滴静注	30分															
4	生理食塩水 デキサート	100ml 6.6mg	点滴静注	30分															
5	生理食塩水 ザノサー	100ml 500mg/m2	点滴静注	30分															
6	生理食塩水 フルオロウラシル	100ml 400mg/m2	点滴静注	30分															
7	生理食塩水	250ml	点滴静注	1時間															
8	ヘパリンNaロック用 10単位	10ml	静注																

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	なし																		