レジメン名	CBDCA+PEM+Nivolumab				
対象がん種	肺がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	3サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	3サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	17.0%	G-CSF
	貧血	23.3%	輸血
その他	食欲低下	16.5%	適正使用ガイドに準ずる
	皮膚障害	8.5%	適正使用ガイドに準ずる
	肺障害	1.1%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ｍｌ	点滴静注	15分		●																				
2	オプジーボ点滴静注用 生食	360mg 100ml	点滴静注	60分		●																				
3	生食	50ｍｌ	点滴静注	15分		●																				
4	プロイメンド点滴静注用 生食	150mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
5	パロノセトロン塩酸塩 デキサート注射液 生食	0.75mg 4.95mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
6	ペメトレキセド点滴静注用 生食	500mg/㎡ 100ml	点滴静注	10分		●																				
7	カルボプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	AUC 6 250ml	点滴静注	1時間		●																				
8	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠						●	●																		