レジメン名	CBDCA+GEM+Durvalumab+Tremelimumab				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	4サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	30.0%	G-CSF
	貧血	49.7%	輸血
その他	甲状腺機能低下症	11.8%	適正使用ガイドに準ずる
	皮膚障害	19.4%	適正使用ガイドに準ずる
	肺障害	3.6%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●													
2	イシュド点滴静注用 生食	75mg 100ml	点滴静注	60分		●																				
3	生食	100ml	点滴静注	60分 (2回目以降は15分)		●																				
4	イミフィンジ点滴静注用 生食	1500mg (30kg以下の場合, 20mg/kg) 100ml	点滴静注	60分		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
6	プロイメンド点滴静注用 生食	150mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
7	パロノセトロン塩酸塩 デキサート注射液 生食	0.75mg 4.95mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
7	デキサート注射液 生食	6.6mg 100ml	点滴静注	30分									●													
8	ゲムシタビン点滴静注用 生食	1000mg/㎡ 100ml	点滴静注	30分		●							●													
9	カルボプラチン点滴静注液 ブドウ糖液5%	AUC 6 250ml	点滴静注	60分		●																				
10	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン4mg錠	1錠	1日1回朝食後				●	●																		