レジメン名	PEM+Durvalumab+Tremelimun										
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	軽度						
		7		1コースの日数	28⊟						
				投与予定回数	1サイクル						
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	1サイクル						
※有の場合薬剤名											

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副	作用など)	
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	30.0%	G-CSF
	貧血	49.7%	輸血
その他	甲状腺機能低下症	11.8%	適正使用ガイドに準ずる
	皮膚障害	19.4%	適正使用ガイドに準ずる
	肺障害	3.6%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容 (支持療法を含む)

				day	1	1 2	2 3	4	5	6	7	' 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp 薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
	50 m l	点滴静注	15分		•																											
2 イシュド点滴静注用 生食	75mg 100ml	点滴静注	60分		•																											
3 生食	100ml	点滴静注	15分		•																											
4 イミフィンジ点滴静注用 生食	20mg/kg) 100ml	点滴静注	60分		•																											
5 生食	50 m l	点滴静注	15分		•																											
6 デキサート注射液 生食	3.3mg/1ml 2ml 100ml	点滴静注	30分		•																											
7 ペメトレキセド点滴静注用 生食	500mg/m² 100ml	点滴静注	10分		•																											
8 生食	50ml	点滴静注	15分		•																											

内服抗がん剤・支持療法薬

	TIMENTO TONI XIIIM MAK																																
ſ	Rp 薬剤名	投与量	用法	 day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Ī	1 なし																																