レジメン名	weekly CBDCA+nab-PAC				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	7日
				投与予定回数	6サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	6サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	64.7%	G-CSF
	貧血	94.1%	輸血
	血小板減少	58.8%	輸血
その他	食欲不振	58.8%	臨床試験プロトコールに準じる
	放射性皮膚炎	94.1%	臨床試験プロトコールに準じる
	放射性食道炎	76.5%	臨床試験プロトコールに準じる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●						
2	パロノセトロン デキサート 生食	0.75mg 6.6mg 100ml	点滴静注	30分		●						
3	アブラキサン 生食	30mg/㎡ 20ml/m^2	点滴静注	30分		●						
4	生食	50ml	点滴静注	15分		●						
5	カルボプラチン ブドウ糖液5%	AUC 2 250ml	点滴静注	60分		●						
6	生食	50ml	点滴静注	15分		●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											