レジメン名	adjuvant GC療法				
対象がん種	尿路上皮癌	対象患者	再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	制限なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	57.0%	減量・G-CSF投与
	貧血	7.0%	減量・輸血
	血小板減少	2.0%	減量・輸血
その他	倦怠感	52.0%	減量・休薬
	食思不振	70.0%	減量・休薬・補液
	便秘	50.0%	下剤投与

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)																					休薬完
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
2	生食 硫酸Mg補正液 KCL注	1000ml 8 mEq 20 mEq	点滴静注	2時間		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	プロイメンド 生食	150mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
5	パロノセトロン デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
6	ゲムシタビン 生食	1000mg/m2 100ml	点滴静注	30分		●																				
7	シスプラチン 生食	70mg/m2 250ml	点滴静注	250mL/hr		●																				
8	ラシックス 生食	20mg 50ml	点滴静注	全開		●																				
9	生食	500ml	点滴静注	2時間		●																				
10	生食	50ml	点滴静注	15分									●													
11	デキサート 生食	6.6mg 100ml	点滴静注	30分									●													
12	ゲムシタビン 生食	1000mg/m2 100ml	点滴静注	30分									●													
13	生食	50ml	点滴静注	15分									●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン	8mg	内服				●	●																		