

レジメン名	ddMVAC				
対象がん種	尿路上皮癌	対象患者	術前	催吐リスク	あり
				1コースの日数	14日
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	制限なし	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	減量・G-CSF投与
	貧血	減量・輸血
	血小板減少	減量・輸血
その他	倦怠感	減量・休薬
	末梢神経障害	減量・休薬
	心障害	休薬

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	生食	50ml	点滴静注	15分	投与時刻(必要時)	●													休薬完了
2	メソレキセート 生食	30mg/m2 50ml	点滴静注	10分		●													
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●													
3	生食	50ml	点滴静注	15分			●												
4	生食 KCL 硫酸Mg補正液	1000ml 20mEq 8mEq	点滴静注	2時間			●												
5	生食	50ml	点滴静注	15分			●												
6	プロイメンド 生食	150mg 100ml	点滴静注	30分			●												
7	パロノセトロン デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 100ml	点滴静注	30分			●												
8	ピンプラスチン 生食	3mg/m2 50ml	点滴静注	15分			●												
9	ドキシルピシン 生食	30mg/m2 50ml	点滴静注	15分			●												
10	シスプラチン 生食	70mg/m2 250ml	点滴静注	250mL/hr			●												
11	ラシックス注20mg 生食	1A 50ml	点滴静注	全開			●												
12	生食	500ml	点滴静注	2時間			●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン	8mg	内服				●	●										
2	ジールスタ	3.6mg	皮下注				●											

シスプラチン投与終了までに1-1.5Lの経口補液