レジメン名	weekly CDDP + RT				
対象がん種	頭頸部がん	対象患者	術後化学療法	催吐リスク	高度
				1コースの日数	7
				投与予定回数	7
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	7
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	87.0%	G4では次回1段階減量、G2以下になるまで延期
	貧血	100.0%	G3以上では輸血を考慮
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●						
2	ソリューゲンG 硫酸マグネシウム KCL	500ml 8mEq 20mEq	点滴静注	2時間		●						
3	ソルデム３A	500ml	点滴静注	2時間		●						
4	生食 デキサート プロイメンド	100ml 9.9mg 150mg	点滴静注	30分		●						
5	生食 パロノセトロン	50ml 0.75mg	点滴静注	30分		●						
6	生食 シスプラチン	250ml 40mg/m2	点滴静注	1時間		●						
7	ソルデム3A	500ml	点滴静注	2時間		●						
8	ソルデム3A	500ml	点滴静注	2時間		●						
9	ラシックス	20mg	静注			●						

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											