レジメン名	modifiedFOLFIRINOX				
対象がん種	膵がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	14日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)(grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	47.8%	減量
	血小板減少	8.7%	減量
	貧血	2.9%	減量
その他	下痢	8.7%	減量
	末梢神経障害	10.1%	減量
	嘔吐	5.8%	減量

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
2	プロイメンド 生食	150 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
3	デキサート パロノセトロン 生食	9.9 mg 0.75 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
4	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	2時間		●													
5	イリノテカン ブドウ糖注5%	150 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	2時間	レボホリナートと 同時投与	●													
6	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	2時間	イリノテカンと 同時投与	●													
7	フルオロウラシル 生食	2400 mg/㎡ 全量100 mL	持続静注	46時間		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	8mg/day	内服				●●	●●											