レジメン名	GEM + DOC				
対象がん種	骨軟部腫瘍	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	89.0%	G1になるまで休薬
	貧血	83.5%	G1になるまで休薬
	血小板減少	67.1%	G1になるまで休薬
その他	肝酵素上昇	60.0%	G1になるまで休薬

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●													
5	生理食塩水 デキサート(3.3mg/ml)	100ml 2ml	点滴静注	200ml/h		●							●													
2	ゲムシタビン 生理食塩水	900mg/m2 100ml	点滴静注	200ml/h		●							●													
6	ドセタキセル 5% ブドウ糖液	70mg/m2 250ml	点滴静注	250ml/h									●													
8	生理食塩水	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カイトリル	2mg	投与前内服										●													