レジメン名	CPT-11				
対象がん種	肺がん	対象患者	再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	56.3%	G-CSF
	貧血	81.3%	輸血
		0.0%	
その他	間質性肺疾患	3.1%	中止
	下痢	59.4%	減量や対症療法
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●							●													
2	パロノセトロン塩酸塩注射剤 デキサート注射液 生食	0.75mg/5ml 1瓶 3.3mg/1ml 3瓶 100ml	点滴静注	30分		●							●							●													
4	イリノテカン 生食	100mg/㎡ 500ml	点滴静注	90分		●							●							●													
5	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																