レジメン名	GEMOX				
対象がん種	精巣腫瘍	対象患者	術前	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	制限なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	制限なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少		減量・G-CSF投与
	貧血		減量・輸血
	血小板減少		減量・輸血
その他	倦怠感		休薬、支持療法
	末梢神経障害		休薬、支持療法

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●													
2	パロノセトロン デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 100ml	点滴静注	30分		●							●													
3	デキサート 生食	6.6mg 100ml	点滴静注	30分									●													
4	ゲムシタビン 生食	1000mg/m2 100ml	点滴静注	30分		●							●													
5	オキサリプラチン ブドウ糖5%注	130mg/m2 500ml	点滴静注	2時間		●																				
6	生食	50ml	点滴静注	15分		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									