レジメン名		Low	Dose FI	P療法	
対象がん種	肝臓がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	中等度
		1		1コースの日数	7
		1		投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし	1		投与回数上限	
※有の場合薬剤名		7			

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)									
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)						
血液毒性	血球減少	40.0%	中止もしくは延期を検討						
		0.0%							
		0.0%							
その他	悪心	10-20%	中止もしくは延期を検討						
	肝予備能低下	10.0%	中止もしくは延期を検討						
		0.0%							

レジメン内容(支持療法を含む)

÷	7777日(人) (从) () () () () () () () () (
					day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1		6.6mg	点滴静注	1時間		•	•	•	•	•		
	生食	100ml										
2	生食	100mL	動注	30分		•	•	•	•	•		
3	3 シスプラチン 生食 10mg 100mL	10mg	- 動注	1時間		•	•	•	•	•		
		100mL										
4	生食	50mL	動注	5分		•	•	•	•	•		
- 5	フルオロウラシル 生食	250mg	動注	5時間		•	•	•	•	•		
	生食	500mL										
6	生食	50mL	動注	5分		•	•	•	•	•		
7	ヘパリンロック 100単位/ml	10ml	動注			•	•	•	•	•		

内服抗がん剤・支持療法薬

This is the second of the seco												
Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし											