

レジメン名	RADPLAT 7weeks				
対象がん種	頭頸部がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	高度
				1コースの日数	7
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数		7
			投与回数上限		7
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少Grade3	14.1%	延期基準を参考
その他	粘膜炎Grade3以上	20.3%	
	クレアチニン上昇	3.1%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7
													休業完了
1	硫酸Mg 生食	10ml 100ml	点滴静注 メイン①	100ml/h			●						
2	ヴィーンF メイン	500ml	点滴静注 メイン①	80ml/h			●						
3	ラクテック サブ	500ml	点滴静注 メイン②	80ml/h			●						
4	パロノセトロン デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 100ml	点滴静注 側管から	200ml/h	入室30分前		●						
5	フロセミド ラクテック	20mg 500ml	点滴静注 メイン①	500ml/h	治療中		●						
6	シスプラチン メイロン	100mg/m2 5ml/m2	動注 全量を50mLシリンジに 均等に分注する	急速動注	治療薬		●						
7	ソルコーテフ 生食	100mg 20ml	動注 CDDP動注部位1箇所 につき100mg 動注する	急速動注	CDDP動注後		●						
8	ソルコーテフ 生食	100mg 20ml	動注 CDDP動注部位1箇所 につき100mg 動注する	急速動注	CDDP動注後		●						
9	デトキシソール	240ml	点滴静注 メイン②	120ml/h	血管造影室持込		●						
10	ヴィーンF	500ml	点滴静注 メイン①	100ml/h	血管造影室持込		●						
11	フロセミド 生食	20mg 1000ml	点滴静注 メイン①	500ml/h	帰室後		●						
12	ラクテック	500ml	点滴静注 メイン①	40ml/h	帰室後		●						
13	ヴィーンF	500ml	点滴静注 メイン②	40ml/h	帰室後		●						
14	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴静注 メイン①	50ml/h				●	●				
15	フロセミド 生食	20mg 1000ml	点滴静注 メイン①	250ml/h				●	●				
16	ラクテック	500ml	点滴静注 メイン①	50ml/h				●	●				
17	ラクテック	500ml	点滴静注 メイン①	50ml/h				●	●				
18	ラクテック	500ml	点滴静注 メイン①	60ml/h						●			
19	ラクテック	500ml	点滴静注 メイン①	60ml/h						●			
20	ラクテック	500ml	点滴静注 メイン①	60ml/h						●			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7
1	アプレビタント	125mg	入室1時間前		●						
2	アプレビタント	80mg	朝食後			●	●				