レジメン名	CDDP+GEM+Pembrolizumab				
対象がん種	胆道がん	対象患者	除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	8コースまで
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少 Grade	46.7%	延期、減量、G-CSF投与
	貧血 Grade≧3	23.3%	延期、減量、輸血
	血小板減少 Grade	16.1%	延期、減量
その他	悪心 Grade≧3	1.3%	延期、減量、制吐剤投与
	疲労 Grade≧3	4.0%	延期、減量
	食欲減退 Grade≧	1.3%	延期、減量

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	30分		●																				
2	キイトルーダ 生理食塩水	200mg 50ml	点滴静注	30分		●																				
3	生理食塩水	50ml	点滴静注	30分		●								●												
4	生理食塩水	500ml	点滴静注	2時間		●								●												
5	生理食塩水 デキサート パロノセトロン	100ml 9.9mg 0.75mg	点滴静注	30分		●								●												
6	生理食塩水 シスプラチン	total 150ml 25mg/m2	点滴静注	2時間		●								●												
7	生理食塩水 ゲムシタビン	100ml 1000mg/m2	点滴静注	30分		●								●												
8	生理食塩水	500ml	点滴静注	2時間		●								●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									