レジメン名	Zolbetuximab+mFOLFOX6（初回）				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	14日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)(Grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	15.8%	
	血小板減少	9.0%	
その他	悪心	64.9%	
	知覚神経障害	19.7%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生食	50 mL	静注	100 mL/h		●													
2	ホスアプレピタント 生食	150mg 100ml	点滴静注	200mL/h		●													
3	デキサート パロノセトロン ポララミン ファモチジン 生食	9.9 mg 0.75 mg 5mg 20mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
4	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
5	ビロイ 生食	800mg/m2 2mg/mLの濃度となるよう希釈	点滴静注	備考欄参照		●													
6	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h															
7	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	125 mL/h		●													
8	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/㎡ 250 mL	点滴静注	2時間		●													
9	フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/㎡ 50 mL	点滴静注	200 mL/h		●													
10	フルオロウラシル 生食	2400 mg/㎡ 全量100 mL	持続静注	46時間		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	デカドロン錠	8mg/day	朝／昼				●●	●●	●●										
2	オランザピン（非DM症例）	5mg	夕			●	●	●	●										