レジメン名	Zolbetuximab+CAPOX（2回目以降）				
対象がん種	胃がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	カペシタビン				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	15.8%	
	血小板減少	9.0%	
その他	悪心	64.9%	
	知覚神経障害	19.7%	
		0.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●																				
2	ホスアプレピタント 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
3	デキサート パロノセトロン ボララミン ファモチジン 生食	9.9 mg 0.75 mg 5mg 20mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h		●																				
4	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h		●																				
5	ピロイ 生食	600mg/m2 2mg/mLの濃度となるよう希釈	点滴静注	備考欄参照		●																				
6	生食	50 mL	点滴静注	200 mL/h		●																				
7	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	130 mg/㎡ 500 mL	点滴静注	2時間		●																				
8	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	カペシタビン	1000 mg/㎡/回	朝／夕			●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●						
2	デカドロン錠	8 mg/day	朝／昼				●●	●●	●●																	
3	オランザピン（非DM症例）	5mg	夕			●	●	●	●																	