レジメン名	CHOEP（3週毎）				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	初発	催吐リスク	高度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	3～8
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	8
※有の場合薬剤名	プレドニゾロン （点滴の場合はなし）				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	90.0%	G-CSF
	貧血	65.0%	
	血小板減少	25.0%	
その他	末梢神経障害	50.0%	VCR減量・中止、薬剤（プレカバリ
	悪心・嘔吐	42.0%	制吐剤
	便秘	38.0%	下剤

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●																		
2	オンコビン 生理食塩液	1.4mg/m2 （最大2mg） 50mL	点滴静注	500mL/hr		●																				
3	ドキソルビシン 生理食塩液	50mg/m2 100mL	点滴静注	200mL/hr		●																				
4	エンドキサン 生理食塩液	750mg/m2 250mL	点滴静注	250mL/hr		●																				
5	エトポシド 生理食塩水	100mg/m2 250mL	点滴静注	250mL/hr		●	●	●																		
6	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●	●																		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	プレドニゾロン	50mg/body or 30mg/m2	朝・昼食後			●●	●●	●●	●●	●●																
2	グラニセトロンゼリー or カイトリル	2mg	化学療法前			●																				
4	他、適宜ST合剤、G-CSFなど																									