レジメン名	大量MTX（1.5g/m2, 2時間）				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	14 days
				投与予定回数	8
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	8
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	頻度不明	抗菌薬、輸血など
その他	食欲不振	77.0%	
	嘔気	71.2%	
	ALT上昇	43.7%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●													
2	メソトレキセート 生理食塩液	1.5g/m2 500mL	点滴静注	2hr	10:00:00	●													
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●													
4	レボホリナート 生理食塩液	6mg 20mL	静注	iv	04:00:00			●	●										
5	レボホリナート 生理食塩液	6mg 20mL	静注	iv	10:00:00		●	●	●										
6	レボホリナート 生理食塩液	6mg 20mL	静注	iv	16:00:00		●	●											
7	レボホリナート 生理食塩液	6mg 20mL	静注	iv	22:00:00		●	●											
8	その他、重曹入りの補液（2000mL/m2）を行い、MTX開始12時間前からダイアモックス1TあるいはIvMTX濃度が低下するまで、1日2～3回続ける																		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	カイトリル	2mg	内服			●													