

レジメン名		EV+Pem(Pem 200mg)			
対象がん種	尿路上皮癌	対象患者	局所進行性	催吐リスク	軽度
			転移性	1コースの日数	21日
				投与予定回数	制限なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	制限なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
末梢神経障害	50.0%	減量・休薬
脱毛	33.2%	ウィッグなど
皮疹	32.7%	減量・休薬
下痢	27.5%	減量・休薬・支持療法
貧血	13.9%	減量・休薬・輸血
高血糖	10.9%	血糖管理・インスリン治療

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	30分		●							●													
2	パドセブ注 注射用水 生食	1.25mg/kg 0.125ml/kg 50ml	点滴静注	30分		●							●													
3	生食	50ml	点滴静注	30分		●							●													
4	キイトルーダ点滴静注 生食	200mg 50ml	点滴静注	30分		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	30分		●																				

※注射用水はパドセブ10mg/mLになるように減量