レジメン名	CDDP+PEM+Pembrolizumab					
対象がん種	肺がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	高度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
				投与予定回数	4サイクル
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	4サイクル
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	42.7%	G-CSF
	貧血	36.1%	輸血
その他	食欲低下	23.2%	適正使用ガイドに準ずる
	皮膚障害	11.9%	適正使用ガイドに準ずる
	肺障害	6.1%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
2	キイトルーダ点滴静注用 生食	200mg 50ml	点滴静注	30分		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	15分		●																				
4	プロイメンド点滴静注用 生食	150mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
5	パロノセトロン塩酸塩注 デキサート注射液 生食	0.75mg 9.9mg 100ml	点滴静注	30分		●																				
6	ベメトレキセド点滴静注用 生食	500mg/㎡ 100ml	点滴静注	10分		●																				
7	ソリューゲンG アスパラギン酸K注射液 硫酸Mg補正液1mEq/ml	500ml 10mEq 8ml	点滴静注	1時間		●																				
8	20%マンニットール注射液	300ml	点滴静注	36分		●																				
9	シスプラチン注射液 生食	75mg/㎡ 250ml	点滴静注	90分		●																				
10	ソリューゲンG アスパラギン酸K注射液	500ml 10mEq	**点滴静注**	1時間		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン4mg錠	2錠	1日2回朝・昼食後				●●	●●																		
2	オランザピン5mg錠	1錠	1日1回夕食後			●	●	●																		