レジメン名	エンドキサン					
対象がん種	全身性血管炎，血管炎を伴うリウマチ性疾患	対象患者		催吐リスク	該当分類なし
	多発筋炎/皮膚筋炎			1コースの日数	14日間
	全身性エリテマトーデス			投与予定回数	1回
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	不明	投与中止・延長など
その他	悪心・嘔吐	20.7%	制吐剤内服，投与中止など
	脱毛	24.3%	投与中止など
	イレウス，心不全	5%未満	投与中止，延期など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)														**休薬完了**
1	生食	50ml	点滴静注	200mL/h	ルート確保用	●													
2	エンドキサン ５％ブドウ糖液	500ｍｇ/㎡ 100mL	点滴静注	100mL/h		●													
3	**ラクテック**	500mL	点滴静注	150mL/h	エンドキサン終了後１本目	●													
4	**ヴィーンF注**	500mL	点滴静注	150mL/h	エンドキサン終了後２本目	●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	なし																		