

レジメン名	エルレフィオ 再開用量 (32mg)				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	4days
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

レジメン内容(支持療法を含む)

				day	1	2	3	4
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)			休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●		
2	ボラミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	エルレフィオ1時間前	●		
3	デキサメタゾン 生理食塩液	39.6mg 50mL	点滴静注	100mL/hr	エルレフィオ1時間前	●		
5	エルレフィオ	32mg(0.8ml)	皮下注			●		

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4
1	アセトアミノフェン	600-900mg	内服	エルレフィオ1時間前	●			

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	G-CSF、抗菌薬など
	貧血	輸血など
	血小板減少	輸血など
その他	サイトカイン放出症候群	トシリズムブ、ステロイドなど
	ICANS	ステロイドなど